

	<p>IUDs and Implants LARCS-Long Acting Reversible Contraception ВМС и имплантаты LARCS - Длительно Действующая Обратимая контрацепция</p>
ВНУТРИМАТОЧНОЕ СРЕДСТВО (ВМС)	ИМПЛАНТ (НЕХПЛАНОН)
<p>Основы</p> <p>Это крошечное Т-образное пластиковое устройство вставляется в матку. После размещения ВМС работает в течение многих лет (3-12 лет , в зависимости от того, какое ВМС вы выбираете) - вам не нужно ничего делать. ВМС эффективно предотвращает более 99% беременностей, и вы можете удалить его, когда вы захотите. Вы сможете быстро забеременеть, как только ВМС будет удалено.</p>	<p>Основы</p> <p>Этот тонкий гибкий стержень помещается под кожу вашего плеча. Он совершенно невидим и работает годами. Вам не нужно помнить принимать таблетки, заполнять рецепт или делать что-нибудь еще - это просто работает. Имплант эффективен в предотвращении беременности более, чем в 99%, и вы можете удалить его, когда захотите.</p>
<p>Как это работает?</p> <p>ВМС работает с вашим телом так, чтобы изменить подвижность спермы и не позволяет сперме достичь яйцеклетки.</p>	<p>Как это работает?</p> <p>Имплантат выделяет гормон (прогестерон), который препятствует тому, чтобы в яичниках созрели яйцеклетки. Также утолщается цервикальная слизь и блокируется проникновение спермы.</p>
<p>Это безопасно?</p> <p>ВМС является безопасным методом контрацепции. Не вызывает бесплодие.</p>	<p>Чего мне ожидать?</p> <p>Вы почувствуете быстрое сдавление и жжение с небольшим уколом обезболивающего лекарства, а так же введение имплантата. Наиболее распространенным побочным эффектом после введения является небольшие синяки и болезненность в месте укола. Многие девушки будут испытывать нерегулярные кровотечения, которое обычно улучшается в течение 3-6 месяцев. У некоторых на самом деле могут быть более легкие менструации или их отсутствие, а у большинства из них будет меньше болей, в дни менструаций.</p>
<p>Чего мне следует ожидать?</p> <p>Вы можете испытывать боль и спазмы, при введении ВМС. У некоторых женщин спастические боли могут быть в течение одного или двух дней после введения ВМС. Большинство подростков сообщают о боли '6 из 10' по визуальной шкале в процессе установки ВМС, но дискомфорт кратковременный . Прием ибупрофена до и после введения ВМС может помочь снять боли. Самые распространенные побочные эффекты - кровотечения и спастические боли. Это</p>	<p>Кто использует имплантат?</p> <p>Женщины, которые хотят эффективной длительной контрацепции на годы. Имплантат является отличным вариантом для подростков, потому что он безопасен, прост и удобен.</p> <p>Для большей информации</p> <p>www.bedsider.org</p>

<p>обычно проходит через 3-6 месяцев или раньше. Некоторые женщины не испытывают побочные эффекты, а у многих женщин прекращаются менструации и связанные с ними боли.</p>	
<p>Кто использует ВМС?</p> <p>Женщины, которые хотят эффективной профилактики беременности, которая длится годы. Подростки любят ВМС, потому что они невидимы, ничего не нужно делать и работают очень хорошо, чтобы предотвратить незапланированную беременность.</p>	

(НЕХПЛАНОН) - tradename